NUCLEO FEED LOT

Suplemento Alimenticio



CONCENTRADO PROTEICO

Composición Centesimal del producto	Mínimo	Máximo
PROTEÍNA BRUTA	37,00 %	
CALCIO	2,50 %	3,50 %
FÓSFORO	0,50 %	0,70 %
T.N.D.	55,00 %	
FIBRA CRUDA		20,00 %
HUMEDAD		13,00 %
EQUIVALENTE PROTEICO		12,94 %

Concentrado proteico con medicamento

ENGORDE A CORRAL CON HENO + MAÍZ ENTERO

DOSIFICACIÓN:

- A partir de los **250 kg** de peso vivo y hasta la terminación del engorde.

Período de Adaptación (21 días)	Mezcla de Núcleo + Maíz Entero		Consumo de Ración	Heno
	Núcleo	*Maíz*	*(% Del Peso Vivo)*	
1ra. Semana	15 %	85 %	1,5 %	A Voluntad
2ra. Semana	15 %	85 %	2,0 %	A Voluntad
3ra. Semana	15 %	85 %	2,5 %	A Voluntad

Período de Terminación	Mezcla de Núcleo + Maíz Entero		Consumo de Ración	Heno
	Núcleo	*Maíz*		
4ta. Semana hasta terminación	10 %	90 %	A Voluntad	Dar acceso media hora por día

Balanceados Vital

CONCENTRADO PROTEICO

INDICACIONES DE USO:

Concentrado proteico, formulado para la terminación de animales en sistemas de confinamiento.

Una vez mezclado con granos, silos o forrajes, se obtiene una dieta completa, que satisface todas las necesidades nutricionales del animal.

En el caso de no contar con una buena infraestructura de reparto y mezcla de alimentos, como ser un Mixer y moledora de heno, donde la fibra y los granos están perfectamente mezclados, se aconseja usar maíz entero para evitar situaciones de acidosis.

Consideraciones de Manejo:

* Los 2 primeros días de encierro se debe suministrar Heno solo, para lograr disminuir el hambre de los animales y así evitar excesos de consumo de ración que pudieran ocasionar disturbios digestivos.
* Solo puede iniciarse con grano desde el 1er día en caso que los animales estén siendo suplementados con grano en el periodo previo de pastoreo o que vengan de rastrojos de maíz.
* Periodo de adaptación consiste en adaptar al animal y su rumen a un alto consumo de granos, evitando los trastornos digestivos, comunes en estas dietas (Empaste, Paro Ruminal, Acidosis, Diarreas, Etc.).
* Importante: la calidad del heno debe ser de buena palatabilidad para garantizar el interes general de los animales.
* Distribuir el heno lo mejor posible, para asegurarse que todos los animales puedan consumirlo correctamente.
* Como los animales comen en el comedero, grano y concentrado sin fibra, debe garantizarse un espacio para que todos los animales coman al mismo tiempo. Esto significa que en terneros y novillitos necesitan un mínimo de 30 cm por animal, y los novillos pesados un mínimo de 45 cm.

*Disponer:

> 30-40 mt2 de corral por animal.
> Agua de consumo de buena calidad y mantener los bebederos limpios cada 4-5 dias.

* Preveer corrales alternativos para cuando haya mucho barro, el que origina estrés, disturbio de consumo y disminuye la conversión alimenticia.
* Tener muy presente que en este sistema de engorde, es fundamental un buen manejo y control de todas las tareas.

En el caso que se cuente con Granos Molidos o Húmedos, se debe moler el heno y mezclarlo en forma uniforme en todas las etapas descriptas. Consulte con nuestro departamento tecnico.

Balanceados Vital

ENGORDE A CORRAL CON SILOS

DOSIFICACIÓN:

- A partir de los **250 kg** de peso vivo y hasta la terminación del engorde.

Período de Adaptación (21 días)	Núcleo Feed Lot	Maíz Molido	Silo
1ra. Semana	15 %	30 %	55 %
2ra. Semana	15 %	45 %	40 %
3ra. Semana	15 %	50 %	35 %

Período de Terminación	Núcleo Feed Lot	Maíz Molido	Silo
4ta. Semana hasta terminación	10 %	60 %	30 %

También se puede realizar este sistema con otros cereales molidos o en estado de grano humedo. Otra alternativa valida es hacerlo con maiz grano entero. Consulte con nuestro departamento tecnico.

CONCENTRADO PROTEICO

SISTEMA DE ENGORDE DE MACHOS HOLANDO

DOSIFICACIÓN:

- A partir de los **75 kg** de peso vivo (3 meses de vida) y con animales que ya estén deslechados y consumiendo ración de Ternero Extra (Destete precoz) a discreción en forma estable y como única ración, utilizar 80% de maíz entero y 20% de **Concentrado Recrias**, hasta los **150 kg** de peso vivo (en tiempo esto representa unos 60 a 70 días).
- De este momento en adelante y hasta los **250 kg** de peso vivo se utilizara 85% de maíz entero y 15% de **Concentrado Recrias**.
- Desde los **250 kg** hasta la terminación utilizar 90% de maiz entero y 10% de **Núcleo Feed Lot**.

Terneros	Maíz Entero	Concentrado	
de 75 a 150 kg. de peso vivo	80 %	20 %	Concentrado Recria
de 150 a 250 kg. de peso vivo	85 %	15 %	Concentrado Recria
de 250 kg. a terminación	90 %	10 %	Nucleo Feed Lot

El kilaje de terminación de los animales dependerá de la genética del Holando en engorde, como idea general se terminaran entre 330 y 360 kg para lo cual estarán consumiendo entre 5 kg a 5,5 kg de ración total para generar 1 kg de carne en promedio de todo el engorde.

INDICACIONES DE USO:

Consideraciones de Manejo:

* Castrar los terneros cuando tengan 1 o 2 meses de edad y aplicar un plan sanitario preventivo adecuado contra enfermedades parasitarias e infecciosas, pues en estos sistemas a corral hay mayor contagio y desarrollo de las mismas.
* Mantener el alimento siempre a voluntad, evitando que se ensucie o humedezca, para lo cual es conveniente tener los comederos sobreelevados, o en tolvas de auto consumo y ofertar unos 30 cm de comedero por animal.
* Disponer de un mínimo de 30 a 40 mt2 de corral por animal, agua de consumo de buena calidad y mantener los bebederos limpios cada 4-5 dias.
* Preveer corrales alternativos para cuando haya mucho barro, el que origina estrés, disturbio de consumo y disminuye la conversion alimenticia.

Balanceados Vital